



แนวทางการสั่งใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การใช้ยาในกลุ่ม NSAID ในผู้ป่วย CKD stage 3 ขึ้นไป
(Diclofenac, Ibuprofen)

กรณีจำเป็นต้องใช้ ให้ใช้ขนาดต่ำ ระยะสั้น และติดตามอาการ อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย

ระยะเวลาในการติดตามแบ่งตาม CKD stage

| Stage IIIa (eGFR 46-59 mL/min/1.73 m ³) | Stage IIIb (eGFR 30-45 mL/min/1.73 m ³) | Stage IV (eGFR 15- 29 mL/min/1.73 m ³) | Stage V, Dialysis eGFR <15 mL/min/1.73 m ³) |
|--|--|---|--|
| แนะนำให้ยาต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ร่วมกับการติดตามอาการ | กรณีจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่ม NSAID แนะนำให้ยาต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ร่วมกับการ ติดตามอาการ | หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAID | |
| คำแนะนำผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม NSAIDs | | | |
| - ถ้ามีอาการชาต่อน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน รุนแรง รับประทานอาหารไม่ได้ ควรหยุดยาในกลุ่ม NSAIDs | | | |
| - ถ้ามีอาการชาบวม หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ปัสสาวะออกลดลง ให้กลับมาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล | | | |
| *** ผู้ป่วยสูงอายุ > 60 ปี ที่ไม่มีผลตรวจค่าการทำงานของไต กรณีจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs แนะนำให้ใช้ยาต่อเนื่องไม่เกิน 1 สัปดาห์ | | | |
| หลีกเลี่ยงการกินยาในกลุ่ม NSAIDs คู่กันเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการเกิดพิษต่อไตที่รุนแรงในผู้ป่วยทุกราย | | | |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภัทรนุช รุจิวรรณ)
เภสัชกรชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายภาณุวัฒน์ กาญจนวาทะ)
นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย
วันที่ 29 ธันวาคม 2560