



แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ซักประวัติ

การวินิจฉัยและการให้การรักษา

กรณีไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ

อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

- ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
- มีอาการอาเจียนเด่น
- มีประวัติขึ้น เช่น อาหารที่เสี่ยง หรือมีผู้อื่นที่กินอาหารเป็นพิษพร้อมกัน

ท้องร่วงชนิด Non-invasive

(แบคทีเรียไม่ลุกล้ำเข้าไปในผนังลำไส้)

- ถ่ายอุจจาระเหลวจำนวน 3 ครั้งต่อวันหรือมากกว่าหรือถ่ายมีมูกหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง

การรักษา

- ให้สารน้ำอย่างเพียงพอ เช่น ORS จิบแทนน้ำ
- ยาบรรเทาอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาลดการหดเกร็งของลำไส้
- Charcoal capsule 2-4 cap tid-qid ac x3 days
- ยาฟ้าทะลายโจร (350 mg/cap) 2-4 cap qid po pc x3 days
- กลัวยเม็ด 3-5 tab qid po pc x3 days

(หากอาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาโรงพยาบาล)

กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ

สงสัยติดเชื้อ (Acute infectious diarrhea)

ท้องร่วงชนิด Invasive (แบคทีเรียลุกล้ำเข้าไปในผนังลำไส้)

- มีไข้ $> 38^{\circ}\text{C}$ และอุจจาระมีเลือดปนเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือตรวจพบ RBC และ WBC ในอุจจาระ

เด็ก

- Cotrimoxazole suspension
10 MKD po (trimethoprim) divided BID pc x 3 - 5 days

ผู้ใหญ่

- Norfloxacin (400) 1 tab po BID pc x 3-5 days

MKD = mg/kg/day

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภัทรนุช รุจิวรรณ)

เภสัชกรชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายภาณุวัฒน์ กาญจนะวาหะ)

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย

วันที่ 29 ธันวาคม 2560