



แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(Non-Communicable Diseases; NCD)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยง
1	หลีกเลี่ยงการใช้ ACEIs (enalapril) ร่วมกับ ARBs (losartan) เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไตวายเฉียบพลัน และ serious hyperkalemia
2	ใช้ metformin เป็นยาขนานแรกในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อไม่มีข้อห้าม ได้แก่ ผู้ที่มีการประเมินค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่า 30 มล./นาที่/1.73 ตารางเมตร หรือผู้ป่วยที่มีสมรรถภาพการทำงานของตับ หัวใจ ปอดเสื่อมลงมาก หรือมีภาวะความดันเลือดต่ำ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะ lactic acidosis
3	หลีกเลี่ยงการใช้ metformin ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 4 ขึ้นไป หรือระยะที่ 3b ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด lactic acidosis
4	หลีกเลี่ยง glibenclamide ในผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดระดับน้ำตาลต่ำในเลือด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุสูงกว่า 65 ปี หรือผู้ที่มี eGFR ต่ำกว่า 60 มล./นาที่/1.73 ตารางเมตร หากต้องใช้ sulfonylurea แนะนำให้ใช้ glipizide
5	ห้ามใช้ simvastatin ร่วมกับ gemfibrozil
6	หลีกเลี่ยงการใช้ simvastatin ในขนาดเกินวันละ 20 มก. เมื่อใช้ร่วมกับ amlodipine หรือเกินวันละ 10 มก. เมื่อใช้ร่วมกับ diltiazem หรือ verapamil

ผู้จัดทำ..... (นางสาวภัทรนุช รุจิวรรณ) เภสัชกรชำนาญการ	ผู้อนุมัติ..... (นายสมเกียรติ สอดโคกสูง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ..... (นายภาณุวัฒน์ กาญจนวาทะ) นายแพทย์ชำนาญการ	