



แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยา Diazepam อย่างสมเหตุผล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางการใช้ยา Diazepam

ข้อบ่งใช้ของยา diazepam

- ผู้ป่วยมีความเครียด และวิตกกังวล
- ผู้ป่วยที่มีปัญหานอนไม่หลับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย
- ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับยาต่อเนื่อง

ผู้ป่วยอายุ < 65 ปี

- สั่งจ่ายยาครั้งละ ไม่เกิน 10 เม็ด
- ควรเริ่มยาในขนาดต่ำก่อน
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการทำงาน ของตับบกพร่อง
- ผู้ป่วยที่มีการใช้ยา มากกว่า 2 ครั้ง/ เดือน
พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลโนนไทยเพื่อพิจารณา การรักษา

ผู้ป่วยอายุ ≥ 65 ปี

- หลีกเลี่ยงการใช้ เนื่องจากอาจทำให้เกิด impaired cognitive function และเพิ่มโอกาสเกิดการหกล้ม
- พิจารณาความจำเป็นที่ต้องใช้ยา โดยควรเลือกใช้ non-pharmacological treatment ก่อน
- ผู้ป่วยที่ประเมินแล้วมีความจำเป็นควรได้รับยา กลุ่ม benzodiazepine พิจารณาส่งต่อ โรงพยาบาลโนนไทยเพื่อพิจารณาการรักษา
- ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลจิตเวชซึ่ง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยา ควร ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา และแนะนำการ เฝ้าระวังผลที่อาจขึ้นเกิดจากยา

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภัทรนุช รุจิวรรณ)
เภสัชกรชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายภาณุวัฒน์ กาญจนวาทะ)
นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติ.....

(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐