

Digoxin (ดิ-จ็อก-ซิน)

หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์

- ☐ มองเห็นภาพเป็นสีเหลืองหรือเขียว
- ☐ อาเจียนรุนแรง
- ☐ เบื่ออาหาร อจจระรัง
- ☐ หัวใจเต้นช้า เต้นผิดจังหวะ
(ชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที)

คำแนะนำอื่นๆ

- ห้ามปรับขนาดยาเองโดยเด็ดขาด
- หากท้องร่วง อาเจียนมาก ให้รีบมาพบแพทย์
- ควรกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ได้แก่กล้วย ส้ม มะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ
- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ถ้าลืมกินยา ให้หัดดมยาลิ้น และให้กินมือต่อไปตามปกติ

ห้ามนำยายาที่ลืมหากินรวมกับยาเม็ดดัดไป

***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อระวัง อาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย ติดต่อห้องยา โรงพยาบาลโนนไทย โทร 044-381032 ต่อ 601-603



Digoxin (ดิ-จ็อก-ซิน)

หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์

- ☐ มองเห็นภาพเป็นสีเหลืองหรือเขียว
- ☐ อาเจียนรุนแรง
- ☐ เบื่ออาหาร อจจระรัง
- ☐ หัวใจเต้นช้า เต้นผิดจังหวะ
(ชีพจรต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที)

คำแนะนำอื่นๆ

- ห้ามปรับขนาดยาเองโดยเด็ดขาด
- หากท้องร่วง อาเจียนมาก ให้รีบมาพบแพทย์
- ควรกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ได้แก่กล้วย ส้ม มะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ
- ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ไม่ควรขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ถ้าลืมกินยา ให้หัดดมยาลิ้น และให้กินมือต่อไปตามปกติ

ห้ามนำยายาที่ลืมหากินรวมกับยาเม็ดดัดไป

***อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อระวัง อาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แต่หากมีข้อสงสัย ติดต่อห้องยา โรงพยาบาลโนนไทย โทร 044-381032 ต่อ 601-603



Warfarin (วาร์-ฟาร์-ริน)



หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์

☐ เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ ถ่ายดำ ปัสสาวะสีสนิมหรือสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ ไอเป็นเลือดหรือเสมหะเป็นเลือด เป็นแผลหรือเลือดไหลไม่หยุด

- ☐ ปวดหัวเฉียบพลัน เวียนหัว หน้ามืด
- ☐ แขนขาบวม
- ☐ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก
- ☐ รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติ

อาการที่เกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้

(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)

☐ อาการเลือดออกเล็กน้อย เช่น เลือดออกตามไรฟัน มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน มีเลือดกำเดา เกิดจ้ำเลือดตามผิวหนัง มีประจำเดือนมากกว่าปกติ

คำแนะนำอื่นๆ

- แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆทุกครั้ง ว่าท่านรับประทานยา วาร์ฟาริน อยู่

- ห้ามปรับขนาดยาโดยเด็ดขาด
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ควรกินผักใบเขียวในปริมาณสม่ำเสมอ เพราะมีวิตามินเคที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ต่อยา
- ยาทำให้เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ หากต้องการมีบุตรให้ปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระแทกหรือทำให้เกิด

เลือดออก เช่น การนวด

- ถ้าลืมหากินยา ให้งดยามื้อนั้น และให้กินมื้อต่อไปตามปกติ ห้ามนำยามื้อที่ลืมหากินรวมกับมื้อถัดไป

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ห้องยา โรงพยาบาล

โนนไทย โทร 044-381032 ต่อ 601-603***

Warfarin (วาร์-ฟาร์-ริน)



หากพบอาการต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์

☐ เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ ถ่ายดำ ปัสสาวะสีสนิมหรือสีเหมือนน้ำล้างเนื้อ ไอเป็นเลือดหรือเสมหะเป็นเลือด เป็นแผลหรือเลือดไหลไม่หยุด

- ☐ ปวดหัวเฉียบพลัน เวียนหัว หน้ามืด
- ☐ แขนขาบวม
- ☐ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก
- ☐ รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติ

อาการที่เกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยานี้

(แจ้งแพทย์-เภสัชกรให้ทราบเมื่อมารับยาคราวหน้า)

☐ อาการเลือดออกเล็กน้อย เช่น เลือดออกตามไรฟัน มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน มีเลือดกำเดา เกิดจ้ำเลือดตามผิวหนัง มีประจำเดือนมากกว่าปกติ

คำแนะนำอื่นๆ

- แจ้งแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆทุกครั้ง ว่าท่านรับประทานยา วาร์ฟาริน อยู่

- ห้ามปรับขนาดยาโดยเด็ดขาด
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ควรกินผักใบเขียวในปริมาณสม่ำเสมอ เพราะมีวิตามินเคที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ต่อยา
- ยาทำให้เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ หากต้องการมีบุตรให้ปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระแทกหรือทำให้เกิด

เลือดออก เช่น การนวด

- ถ้าลืมหากินยา ให้งดยามื้อนั้น และให้กินมื้อต่อไปตามปกติ ห้ามนำยามื้อที่ลืมหากินรวมกับมื้อถัดไป

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ห้องยา โรงพยาบาล

โนนไทย โทร 044-381032 ต่อ 601-603***

ฉลากยาเสริมสำหรับ
โอบูโปรเฟนชนิดเม็ด



- 1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน
- 2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดที่ต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจ หรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวมและความดันโลหิตสูง

ฉลากยาเสริมสำหรับ
โอบูโปรเฟนชนิดเม็ด



- 1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน
- 2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดที่ต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจ หรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวมและความดันโลหิตสูง

ฉลากยาเสริมสำหรับ
โอบูโปรเฟนชนิดเม็ด



- 1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน
- 2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดที่ต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจ หรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวมและความดันโลหิตสูง

ฉลากยาเสริมสำหรับ
โอบูโปรเฟนชนิดเม็ด



- 1 ยานี้เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด ห้ามใช้ยานี้ถ้าเคยแพ้เอ็นเสดชนิดอื่น เช่น แอสไพริน
- 2 ควรใช้เอ็นเสดด้วยขนาดที่ต่ำที่สุด และด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอันตรายจากยา เช่น แผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้ (ปวดท้อง แสบท้อง) เลือดออกทางเดินอาหาร (ถ่ายดำ เป็นลม) ไตวาย หลอดเลือดหัวใจ หรือสมองอุดตัน (กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเป็นอัมพาต) ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง ผลข้างเคียงข้างต้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ยังอาจทำให้มีอาการบวมและความดันโลหิตสูง

ฉลากยาเสริมสำหรับ เมตฟอร์มิน



- 1 เบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายควรได้รับยานี้เป็นยาขนานแรก (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
- 2 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 3 โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
- 4 ห้ามใช้กับภาวะไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ เมตฟอร์มิน



- 1 เบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายควรได้รับยานี้เป็นยาขนานแรก (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
- 2 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 3 โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
- 4 ห้ามใช้กับภาวะไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ เมตฟอร์มิน



- 1 เบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายควรได้รับยานี้เป็นยาขนานแรก (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
- 2 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 3 โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
- 4 ห้ามใช้กับภาวะไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ เมตฟอร์มิน



- 1 เบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายควรได้รับยานี้เป็นยาขนานแรก (ยกเว้นมีข้อห้ามใช้)
- 2 การใช้ยานี้ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 3 โดยทั่วไปยานี้ไม่ทำให้เกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ (หิว มือสั่น ใจสั่น)
- 4 ห้ามใช้กับภาวะไตวายเรื้อรังขั้นรุนแรง (ระยะที่ 4 และ 5) เนื่องจากยาจะสะสมและนำไปสู่ภาวะกรดเกินในเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงรุนแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ ลอราทาดีน



- 1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดวงวน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคที่มีสาเหตุจากการแพ้หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า "ยาลดน้ำมูก" เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับ ลอราทาดีน



- 1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดวงวน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคที่มีสาเหตุจากการแพ้หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า "ยาลดน้ำมูก" เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับ ลอราทาดีน



- 1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดวงวน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคที่มีสาเหตุจากการแพ้หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า "ยาลดน้ำมูก" เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับ ลอราทาดีน



- 1 ยานี้เป็นยาแก้แพ้ชนิดวงวน้อย ใช้เฉพาะเมื่ออาการของโรคที่มีสาเหตุจากการแพ้หรือโรคภูมิแพ้เท่านั้น เช่น ในกรณีน้ำมูกไหลเรื้อรังจากโรคภูมิแพ้ เป็นผื่นคันจากการแพ้หรือเป็นผื่นลมพิษ เป็นต้น
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า "ยาลดน้ำมูก" เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าลดน้ำมูกได้จากทุกสาเหตุ

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อัลโลพูรินอล



- 1 ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
- 2 สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของการใช้ยา
- 3 หยุดยาและมาพบแพทย์ทันทีถ้ามีผื่น ตุ่มพอง มีไข้สูง เจ็บคอ เจ็บตา ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
- 4 ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียวไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปฏิกิริยาตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อัลโลพูรินอล



- 1 ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
- 2 สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของการใช้ยา
- 3 หยุดยาและมาพบแพทย์ทันทีถ้ามีผื่น ตุ่มพอง มีไข้สูง เจ็บคอ เจ็บตา ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
- 4 ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียวไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปฏิกิริยาตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อัลโลพูรินอล



- 1 ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
- 2 สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของการใช้ยา
- 3 หยุดยาและมาพบแพทย์ทันทีถ้ามีผื่น ตุ่มพอง มีไข้สูง เจ็บคอ เจ็บตา ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
- 4 ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียวไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปฏิกิริยาตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อัลโลพูรินอล



- 1 ห้ามใช้ยานี้โดยเด็ดขาด ถ้าเคยแพ้ยานี้
- 2 สังเกตการมีผื่นตามผิวหนังหลังใช้ยานี้เพราะอาจเกิดการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของการใช้ยา
- 3 หยุดยาและมาพบแพทย์ทันทีถ้ามีผื่น ตุ่มพอง มีไข้สูง เจ็บคอ เจ็บตา ตาแดง หรือมีแผลในปากหลังใช้ยา
- 4 ผู้มีกรดยูริกสูงในเลือดเพียงประการเดียวไม่ควรใช้ยานี้ แต่ควรใช้เมื่อมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น มีอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ มีนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือมีปฏิกิริยาตามข้อที่เกิดจากโรคเกาต์ร่วมด้วย

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อะมอกซิซิลิน



- 1 ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ไม่มีคุณสมบัติในการแก้
อักเสบ และไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”
- 3 การใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้อง
ใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้น
หัวใจรั่ว
- 4 โรคหัด ไอ เจ็บคอ และไซนัสอักเสบส่วนใหญ่
เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เอง
ด้วยภูมิคุ้มกันโรค
- 5 การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อ ทำให้แบคทีเรียดื้อยา
ทั้งดื้อต่อยานี้แล้วยาปฏิชีวนะซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อ
ติดเชื้อที่ร้ายแรง
- 6 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อะมอกซิซิลิน



- 1 ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ไม่มีคุณสมบัติในการแก้
อักเสบ และไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”
- 3 การใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้อง
ใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้น
หัวใจรั่ว
- 4 โรคหัด ไอ เจ็บคอ และไซนัสอักเสบส่วนใหญ่
เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เอง
ด้วยภูมิคุ้มกันโรค
- 5 การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อ ทำให้แบคทีเรียดื้อยา
ทั้งดื้อต่อยานี้แล้วยาปฏิชีวนะซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อ
ติดเชื้อที่ร้ายแรง
- 6 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อะมอกซิซิลิน



- 1 ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ไม่มีคุณสมบัติในการแก้
อักเสบ และไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”
- 3 การใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้อง
ใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้น
หัวใจรั่ว
- 4 โรคหัด ไอ เจ็บคอ และไซนัสอักเสบส่วนใหญ่
เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เอง
ด้วยภูมิคุ้มกันโรค
- 5 การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อ ทำให้แบคทีเรียดื้อยา
ทั้งดื้อต่อยานี้แล้วยาปฏิชีวนะซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อ
ติดเชื้อที่ร้ายแรง
- 6 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ
อะมอกซิซิลิน



- 1 ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ไม่มีคุณสมบัติในการแก้
อักเสบ และไม่ออกฤทธิ์ต่อไวรัส
- 2 ไม่ควรเรียกยานี้ว่า “ยาแก้อักเสบ”
- 3 การใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอจากแบคทีเรียต้อง
ใช้ยานี้นาน 10 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ลิ้น
หัวใจรั่ว
- 4 โรคหัด ไอ เจ็บคอ และไซนัสอักเสบส่วนใหญ่
เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะหายได้เอง
ด้วยภูมิคุ้มกันโรค
- 5 การใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อ ทำให้แบคทีเรียดื้อยา
ทั้งดื้อต่อยานี้แล้วยาปฏิชีวนะซึ่งอาจทำให้ไม่มียาใช้เมื่อ
ติดเชื้อที่ร้ายแรง
- 6 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงถึงชีวิตได้

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ชิมวาสแตติน



- 1 ยานี้ใช้ลดไขมันเลวในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
- 2 ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจและสมอง
- 3 การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
- 4 ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย เป็นอันตรายไม่มีสาเหตุ หากมีอาการรุนแรงต้องหยุดยาทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ชิมวาสแตติน



- 1 ยานี้ใช้ลดไขมันเลวในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
- 2 ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจและสมอง
- 3 การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
- 4 ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย เป็นอันตรายไม่มีสาเหตุ หากมีอาการรุนแรงต้องหยุดยาทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ชิมวาสแตติน



- 1 ยานี้ใช้ลดไขมันเลวในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
- 2 ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจและสมอง
- 3 การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
- 4 ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย เป็นอันตรายไม่มีสาเหตุ หากมีอาการรุนแรงต้องหยุดยาทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ชิมวาสแตติน



- 1 ยานี้ใช้ลดไขมันเลวในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์ ช่วยเพิ่มไขมันดีคือเอชดีแอลได้บ้าง
- 2 ใช้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ในคนที่มีความเสี่ยงสูง หรือใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้เป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจและสมอง
- 3 การควบคุมไขมันในเลือดให้ได้ผลต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ร่วมด้วย และควรหยุดสูบบุหรี่
- 4 ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย เป็นอันตรายไม่มีสาเหตุ หากมีอาการรุนแรงต้องหยุดยาทันที

ฉลากยาเสริมสำหรับ

อินทาลาพริล



1

แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่น
นอกเหนือจากภาวะความดันโลหิตสูง หากสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2

ยานี้อาจทำให้เกิดการไอเรื้อรัง ลักษณะไอ
แบบแห้งๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้
เป็นผลข้างเคียงจากยาซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอ
หรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอ
จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง
เพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้ง
ให้แพทย์ทราบว่ามีการไอ ซึ่งแพทย์จะทำการ
วินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน

ฉลากยาเสริมสำหรับ

อินทาลาพริล



1

แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่น
นอกเหนือจากภาวะความดันโลหิตสูง หากสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2

ยานี้อาจทำให้เกิดการไอเรื้อรัง ลักษณะไอ
แบบแห้งๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้
เป็นผลข้างเคียงจากยาซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอ
หรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอ
จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง
เพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้ง
ให้แพทย์ทราบว่ามีการไอ ซึ่งแพทย์จะทำการ
วินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน

ฉลากยาเสริมสำหรับ

อินทาลาพริล



1

แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่น
นอกเหนือจากภาวะความดันโลหิตสูง หากสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2

ยานี้อาจทำให้เกิดการไอเรื้อรัง ลักษณะไอ
แบบแห้งๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้
เป็นผลข้างเคียงจากยาซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอ
หรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอ
จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง
เพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้ง
ให้แพทย์ทราบว่ามีการไอ ซึ่งแพทย์จะทำการ
วินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน

ฉลากยาเสริมสำหรับ

อินทาลาพริล



1

แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่น
นอกเหนือจากภาวะความดันโลหิตสูง หากสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2

ยานี้อาจทำให้เกิดการไอเรื้อรัง ลักษณะไอ
แบบแห้งๆ หรือกระแอม รู้สึกคันในลำคอ อาการนี้
เป็นผลข้างเคียงจากยาซึ่งรักษาไม่ได้ด้วยยาแก้ไอ
หรือยาอื่นใดรวมทั้งยาปฏิชีวนะ เมื่อหยุดยาอาการไอ
จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเอง
เพราะจะทำให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ควรแจ้ง
ให้แพทย์ทราบว่ามีการไอ ซึ่งแพทย์จะทำการ
วินิจฉัยและเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นให้แทน

ฉลากยาเสริมสำหรับ

โคชิชิน



- 1 ยานี้เป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายหากใช้เกินขนาด อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
- 2 หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือด และมีอาการปวดเบ่ง
- 3 หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูงหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
- 4 อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับ

โคชิชิน



- 1 ยานี้เป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายหากใช้เกินขนาด อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
- 2 หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือด และมีอาการปวดเบ่ง
- 3 หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูงหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
- 4 อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับ

โคชิชิน



- 1 ยานี้เป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายหากใช้เกินขนาด อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
- 2 หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือด และมีอาการปวดเบ่ง
- 3 หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูงหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
- 4 อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับ

โคชิชิน



- 1 ยานี้เป็นพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายหากใช้เกินขนาด อย่าเพิ่มขนาดยาเอง
- 2 หยุดยาทันทีถ้ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ 3 ครั้ง คลื่นไส้ อาเจียน หรือปวดท้อง ถ้าอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น ถ่ายอย่างมาก ถ่ายเป็นเลือด และมีอาการปวดเบ่ง
- 3 หยุดยาและรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการแสบร้อนในปากและลำคอ กลืนลำบาก สับสน หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบาก ไข้ขึ้นสูงหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
- 4 อย่าใช้ร่วมกับยาอื่นโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ฉลากยาเสริมสำหรับ

แอมโลดิพีน

- 1 แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- 2 ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแต่เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบอาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
- 3 ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเพื่อป้องกันภาวะเหงือกอักเสบ

ฉลากยาเสริมสำหรับ

แอมโลดิพีน

- 1 แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- 2 ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแต่เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบอาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
- 3 ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเพื่อป้องกันภาวะเหงือกอักเสบ

ฉลากยาเสริมสำหรับ

แอมโลดิพีน

- 1 แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- 2 ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแต่เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบอาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
- 3 ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเพื่อป้องกันภาวะเหงือกอักเสบ

ฉลากยาเสริมสำหรับ

แอมโลดิพีน

- 1 แพทย์อาจใช้ยานี้ด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากภาวะความดันเลือดสูง หากสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- 2 ยานี้อาจทำให้เกิดการบวมที่เท้า ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ส่วนปลายของร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการบวมในระดับน้อยถึงปานกลาง และมักไม่จำเป็นต้องหยุดยาเนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแต่เมื่อมีอาการบวมควรแจ้งให้แพทย์ทราบอาการบวมนี้ไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคไต
- 3 ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเพื่อป้องกันภาวะเหงือกอักเสบ

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ไกลเบนคาไมด์/กลิบพิโซด์

- 1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งหากแก้ไขไม่ทันอาจมีความพิการทางสมองหรือเสียชีวิตได้
- 2 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง
- 3 การใช้ยานี้ต้องทำการควบคุมไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 4 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด ได้แก่รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ไกลเบนคาไมด์/กลิบพิโซด์

- 1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งหากแก้ไขไม่ทันอาจมีความพิการทางสมองหรือเสียชีวิตได้
- 2 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง
- 3 การใช้ยานี้ต้องทำการควบคุมไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 4 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด ได้แก่รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ไกลเบนคาไมด์/กลิบพิโซด์

- 1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งหากแก้ไขไม่ทันอาจมีความพิการทางสมองหรือเสียชีวิตได้
- 2 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง
- 3 การใช้ยานี้ต้องทำการควบคุมไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 4 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด ได้แก่รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล

ฉลากยาเสริมสำหรับ

ไกลเบนคาไมด์/กลิบพิโซด์

- 1 ยานี้เป็นยาต้านเบาหวาน ใช้ลดน้ำตาลในเลือด ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งหากแก้ไขไม่ทันอาจมีความพิการทางสมองหรือเสียชีวิตได้
- 2 ควรใช้ยาต้านเบาหวานตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง
- 3 การใช้ยานี้ต้องทำการควบคุมไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะนั้นจะรักษาไม่ได้ผล
- 4 ตัวอย่างอาการน้ำตาลต่ำในเลือด ได้แก่รู้สึกหิว หน้าซีด คลื่นไส้ เหงื่อแตก ปวดศีรษะ ปากชา มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น หากมีอาการรุนแรงควรดื่มน้ำหวานและรีบไปโรงพยาบาล