วิธีการผสมยาน้ำชนิดผงแห้ง

1. เคาะผงยาในขวดให้กระจายตัว เพื่อป้องกันผงยาเกาะตัวเมื่อเทน้ำลงไป และยาจะละลายได้ง่าย
2. เปิดฝาขวดยาออก ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว เติมลงไปในขวดยาประมาณครึ่งขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าจนผงยากระจาย ไม่จับเป็นก้อน (ห้ามใช้น้ำอุ่น หรือน้ำร้อน เพราะทำให้ตัวยาเสียประสิทธิภาพได้)
3. เปิดฝาขวดยา และเติมน้ำอีกครั้งจนถึงขีด หรือฉลากยาที่กำหนดบนขวดยา
4. ปิดฝาขวด และเขย่าจนยากระจายตัวดี
5. กรณีที่ได้รับยาชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ขวด ให้ผสมทีละขวด และรับประทานหมดก่อนจึงผสมยาขวดต่อไป
6. เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง
7. ควรเก็บยาที่ผสมแล้วในตู้เย็นช่องธรรมดา ได้นาน 14 วัน ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง กรณีเก็บนอกตู้เย็น ให้เก็บพ้นแสงหรือความร้อน สามารถเก็บยาไว้ได้นาน 7 วัน
8. กรณียาผงผสมน้ำเป็นยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ ต้องกินยาติดต่อทุกวันจนยาหมด หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคือง หรือบวม ให้หยุดใช้ยา และมาโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดจากการแพ้ยาได้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

วิธีการผสมยาน้ำชนิดผงแห้ง

1. เคาะผงยาในขวดให้กระจายตัว เพื่อป้องกันผงยาเกาะตัวเมื่อเทน้ำลงไป และยาจะละลายได้ง่าย
2. เปิดฝาขวดยาออก ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว เติมลงไปในขวดยาประมาณครึ่งขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าจนผงยากระจาย ไม่จับเป็นก้อน (ห้ามใช้น้ำอุ่น หรือน้ำร้อน เพราะทำให้ตัวยาเสียประสิทธิภาพได้)
3. เปิดฝาขวดยา และเติมน้ำอีกครั้งจนถึงขีด หรือฉลากยาที่กำหนดบนขวดยา
4. ปิดฝาขวด และเขย่าจนยากระจายตัวดี
5. กรณีที่ได้รับยาชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ขวด ให้ผสมทีละขวด และรับประทานหมดก่อนจึงผสมยาขวดต่อไป
6. เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง
7. ควรเก็บยาที่ผสมแล้วในตู้เย็นช่องธรรมดา ได้นาน 14 วัน ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง กรณีเก็บนอกตู้เย็น ให้เก็บพ้นแสงหรือความร้อน สามารถเก็บยาไว้ได้นาน 7 วัน
8. กรณียาผงผสมน้ำเป็นยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ ต้องกินยาติดต่อทุกวันจนยาหมด หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคือง หรือบวม ให้หยุดใช้ยา และมาโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดจากการแพ้ยาได้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

วิธีการผสมยาน้ำชนิดผงแห้ง

1. เคาะผงยาในขวดให้กระจายตัว เพื่อป้องกันผงยาเกาะตัวเมื่อเทน้ำลงไป และยาจะละลายได้ง่าย
2. เปิดฝาขวดยาออก ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว เติมลงไปในขวดยาประมาณครึ่งขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าจนผงยากระจาย ไม่จับเป็นก้อน (ห้ามใช้น้ำอุ่น หรือน้ำร้อน เพราะทำให้ตัวยาเสียประสิทธิภาพได้)
3. เปิดฝาขวดยา และเติมน้ำอีกครั้งจนถึงขีด หรือฉลากยาที่กำหนดบนขวดยา
4. ปิดฝาขวด และเขย่าจนยากระจายตัวดี
5. กรณีที่ได้รับยาชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ขวด ให้ผสมทีละขวด และรับประทานหมดก่อนจึงผสมยาขวดต่อไป
6. เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง
7. ควรเก็บยาที่ผสมแล้วในตู้เย็นช่องธรรมดา ได้นาน 14 วัน ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง กรณีเก็บนอกตู้เย็น ให้เก็บพ้นแสงหรือความร้อน สามารถเก็บยาไว้ได้นาน 7 วัน
8. กรณียาผงผสมน้ำเป็นยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ ต้องกินยาติดต่อทุกวันจนยาหมด หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคือง หรือบวม ให้หยุดใช้ยา และมาโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดจากการแพ้ยาได้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

วิธีการผสมยาน้ำชนิดผงแห้ง

1. เคาะผงยาในขวดให้กระจายตัว เพื่อป้องกันผงยาเกาะตัวเมื่อเทน้ำลงไป และยาจะละลายได้ง่าย
2. เปิดฝาขวดยาออก ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว เติมลงไปในขวดยาประมาณครึ่งขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่าจนผงยากระจาย ไม่จับเป็นก้อน (ห้ามใช้น้ำอุ่น หรือน้ำร้อน เพราะทำให้ตัวยาเสียประสิทธิภาพได้)
3. เปิดฝาขวดยา และเติมน้ำอีกครั้งจนถึงขีด หรือฉลากยาที่กำหนดบนขวดยา
4. ปิดฝาขวด และเขย่าจนยากระจายตัวดี
5. กรณีที่ได้รับยาชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ขวด ให้ผสมทีละขวด และรับประทานหมดก่อนจึงผสมยาขวดต่อไป
6. เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง
7. ควรเก็บยาที่ผสมแล้วในตู้เย็นช่องธรรมดา ได้นาน 14 วัน ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง กรณีเก็บนอกตู้เย็น ให้เก็บพ้นแสงหรือความร้อน สามารถเก็บยาไว้ได้นาน 7 วัน
8. กรณียาผงผสมน้ำเป็นยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะ ต้องกินยาติดต่อทุกวันจนยาหมด หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคือง หรือบวม ให้หยุดใช้ยา และมาโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดจากการแพ้ยาได้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย