

วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอด		วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอด	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย	
   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อนใช้ยาปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน</li> <li>2. ล้างมือให้สะอาด และแกะกระดาศห่อยาออก</li> <li>3. จุ่มยาลงในน้ำสะอาดให้พอเปียกหมาดๆ</li> <li>4. นอนหงาย โดยชันเข้าขึ้นและแยกขาออก</li> <li>5. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุด โดยใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไป</li> <li>6. นอนในท่าเดิมสักครู่ ไม่ต่ำกว่า 15 นาที เพื่อให้ยาละลายหมด</li> <li>7. ควรเหน็บยาติดต่อกันทุกวันจนหมด</li> <li>8. ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดขณะมีประจำเดือน</li> <li>9. ควรตรวจการมีเพศสัมพันธ์ขณะรักษา</li> </ol> <p>จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย</p>	   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อนใช้ยาปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน</li> <li>2. ล้างมือให้สะอาด และแกะกระดาศห่อยาออก</li> <li>3. จุ่มยาลงในน้ำสะอาดให้พอเปียกหมาดๆ</li> <li>4. นอนหงาย โดยชันเข้าขึ้นและแยกขาออก</li> <li>5. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุด โดยใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไป</li> <li>6. นอนในท่าเดิมสักครู่ ไม่ต่ำกว่า 15 นาที เพื่อให้ยาละลายหมด</li> <li>7. ควรเหน็บยาติดต่อกันทุกวันจนหมด</li> <li>8. ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดขณะมีประจำเดือน</li> <li>9. ควรตรวจการมีเพศสัมพันธ์ขณะรักษา</li> </ol> <p>จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย</p>

วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอด		วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอด	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย	
   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อนใช้ยาปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน</li> <li>2. ล้างมือให้สะอาด และแกะกระดาศห่อยาออก</li> <li>3. จุ่มยาลงในน้ำสะอาดให้พอเปียกหมาดๆ</li> <li>4. นอนหงาย โดยชันเข้าขึ้นและแยกขาออก</li> <li>5. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุด โดยใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไป</li> <li>6. นอนในท่าเดิมสักครู่ ไม่ต่ำกว่า 15 นาที เพื่อให้ยาละลายหมด</li> <li>7. ควรเหน็บยาติดต่อกันทุกวันจนหมด</li> <li>8. ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดขณะมีประจำเดือน</li> <li>9. ควรตรวจการมีเพศสัมพันธ์ขณะรักษา</li> </ol> <p>จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย</p>	   	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อนใช้ยาปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน</li> <li>2. ล้างมือให้สะอาด และแกะกระดาศห่อยาออก</li> <li>3. จุ่มยาลงในน้ำสะอาดให้พอเปียกหมาดๆ</li> <li>4. นอนหงาย โดยชันเข้าขึ้นและแยกขาออก</li> <li>5. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุด โดยใช้นิ้วช่วยดันยาเข้าไป</li> <li>6. นอนในท่าเดิมสักครู่ ไม่ต่ำกว่า 15 นาที เพื่อให้ยาละลายหมด</li> <li>7. ควรเหน็บยาติดต่อกันทุกวันจนหมด</li> <li>8. ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดขณะมีประจำเดือน</li> <li>9. ควรตรวจการมีเพศสัมพันธ์ขณะรักษา</li> </ol> <p>จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย</p>