วิธีการใช้ยาป้ายตา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด จากนั้นเปิดฝาหลอดยาออก โดยวางให้ฝาหงายขึ้น
2. นอน หรือนั่งเงยหน้า
3. ใช้มือข้างหนึ่งดึกเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง เหลือบตาขึ้นบน
4. ใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบหลอดยา และป้ายยาลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่างจากหัวตาไปหางตาประมาณ 1 เซนติเมตร หรือครึ่งนิ้ว ระวังอย่าให้ปลายหลอดถูกแตะถูกตา
5. ปล่อยมือที่ดึงเปลือกตาออก และหลับตา 2-3 นาที กลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังหลับตา
6. เช็ดยาส่วนเกินด้วยสำลี หรือกระดาษทิชชู่ที่สะอาด
7. ปิดฝาหลอดยาให้สนิท
8. ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาป้ายตาร่วมกับยาหยอดตา ให้ใช้ยาหยอดตาก่อนป้ายตาประมาณ 5-10 นาที

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย

วิธีการใช้ยาป้ายตา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด จากนั้นเปิดฝาหลอดยาออก โดยวางให้ฝาหงายขึ้น
2. นอน หรือนั่งเงยหน้า
3. ใช้มือข้างหนึ่งดึกเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง เหลือบตาขึ้นบน
4. ใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบหลอดยา และป้ายยาลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่างจากหัวตาไปหางตาประมาณ 1 เซนติเมตร หรือครึ่งนิ้ว ระวังอย่าให้ปลายหลอดถูกแตะถูกตา
5. ปล่อยมือที่ดึงเปลือกตาออก และหลับตา 2-3 นาที กลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังหลับตา
6. เช็ดยาส่วนเกินด้วยสำลี หรือกระดาษทิชชู่ที่สะอาด
7. ปิดฝาหลอดยาให้สนิท
8. ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาป้ายตาร่วมกับยาหยอดตา ให้ใช้ยาหยอดตาก่อนป้ายตาประมาณ 5-10 นาที

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย

วิธีการใช้ยาป้ายตา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด จากนั้นเปิดฝาหลอดยาออก โดยวางให้ฝาหงายขึ้น
2. นอน หรือนั่งเงยหน้า
3. ใช้มือข้างหนึ่งดึกเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง เหลือบตาขึ้นบน
4. ใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบหลอดยา และป้ายยาลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่างจากหัวตาไปหางตาประมาณ 1 เซนติเมตร หรือครึ่งนิ้ว ระวังอย่าให้ปลายหลอดถูกแตะถูกตา
5. ปล่อยมือที่ดึงเปลือกตาออก และหลับตา 2-3 นาที กลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังหลับตา
6. เช็ดยาส่วนเกินด้วยสำลี หรือกระดาษทิชชู่ที่สะอาด
7. ปิดฝาหลอดยาให้สนิท
8. ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาป้ายตาร่วมกับยาหยอดตา ให้ใช้ยาหยอดตาก่อนป้ายตาประมาณ 5-10 นาที

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย

วิธีการใช้ยาป้ายตา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด จากนั้นเปิดฝาหลอดยาออก โดยวางให้ฝาหงายขึ้น
2. นอน หรือนั่งเงยหน้า
3. ใช้มือข้างหนึ่งดึกเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง เหลือบตาขึ้นบน
4. ใช้มืออีกข้างหนึ่งบีบหลอดยา และป้ายยาลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่างจากหัวตาไปหางตาประมาณ 1 เซนติเมตร หรือครึ่งนิ้ว ระวังอย่าให้ปลายหลอดถูกแตะถูกตา
5. ปล่อยมือที่ดึงเปลือกตาออก และหลับตา 2-3 นาที กลอกลูกตาไปมาทุกทิศทางขณะที่ยังหลับตา
6. เช็ดยาส่วนเกินด้วยสำลี หรือกระดาษทิชชู่ที่สะอาด
7. ปิดฝาหลอดยาให้สนิท
8. ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาป้ายตาร่วมกับยาหยอดตา ให้ใช้ยาหยอดตาก่อนป้ายตาประมาณ 5-10 นาที

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย