วิธีการใช้ยาสวนทวารหนัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวนให้เอาฝาปิดออกก่อน และหล่อลื่นปลายหลอดสวนด้วยการบีบน้ำยาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กน้อย
3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ้นจนหัวเข่าจรดหน้าอก
4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก โดยค่อยๆหมุนขวดยาเข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ
5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดยาอย่างช้าๆ จนน้ำยาหมด หรือตามคำสั่งบนฉลากยา
6. พยายามขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที
7. ให้นอนในท่าเดิมประมาณ 15-30 นาที แม้จะมีความรู้สึกอยากถ่ายก็กลั้นไว้ก่อน หากลุกไปถ่ายทันทีหลังจากสวนยา จะทำให้ยาออกจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่ หากเป็นไปได้ให้กลั้นไว้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย

วิธีการใช้ยาสวนทวารหนัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวนให้เอาฝาปิดออกก่อน และหล่อลื่นปลายหลอดสวนด้วยการบีบน้ำยาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กน้อย
3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ้นจนหัวเข่าจรดหน้าอก
4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก โดยค่อยๆหมุนขวดยาเข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ
5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดยาอย่างช้าๆ จนน้ำยาหมด หรือตามคำสั่งบนฉลากยา
6. พยายามขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที
7. ให้นอนในท่าเดิมประมาณ 15-30 นาที แม้จะมีความรู้สึกอยากถ่ายก็กลั้นไว้ก่อน หากลุกไปถ่ายทันทีหลังจากสวนยา จะทำให้ยาออกจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่ หากเป็นไปได้ให้กลั้นไว้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย

วิธีการใช้ยาสวนทวารหนัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวนให้เอาฝาปิดออกก่อน และหล่อลื่นปลายหลอดสวนด้วยการบีบน้ำยาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กน้อย
3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ้นจนหัวเข่าจรดหน้าอก
4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก โดยค่อยๆหมุนขวดยาเข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ
5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดยาอย่างช้าๆ จนน้ำยาหมด หรือตามคำสั่งบนฉลากยา
6. พยายามขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที
7. ให้นอนในท่าเดิมประมาณ 15-30 นาที แม้จะมีความรู้สึกอยากถ่ายก็กลั้นไว้ก่อน หากลุกไปถ่ายทันทีหลังจากสวนยา จะทำให้ยาออกจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่ หากเป็นไปได้ให้กลั้นไว้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย

วิธีการใช้ยาสวนทวารหนัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโนนไทย

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวนให้เอาฝาปิดออกก่อน และหล่อลื่นปลายหลอดสวนด้วยการบีบน้ำยาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กน้อย
3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ้นจนหัวเข่าจรดหน้าอก
4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก โดยค่อยๆหมุนขวดยาเข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ
5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดยาอย่างช้าๆ จนน้ำยาหมด หรือตามคำสั่งบนฉลากยา
6. พยายามขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที
7. ให้นอนในท่าเดิมประมาณ 15-30 นาที แม้จะมีความรู้สึกอยากถ่ายก็กลั้นไว้ก่อน หากลุกไปถ่ายทันทีหลังจากสวนยา จะทำให้ยาออกจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้เต็มที่ หากเป็นไปได้ให้กลั้นไว้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโนนไทย