

ความคงตัวของยา

ยา Multiple dose / Antiseptic หลังเปิดใช้

| ชื่อยา | ชื่อการค้า | สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับยาที่ยังไม่ได้เปิดใช้ | สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับยาที่เปิดใช้แล้ว | วันหมดอายุ ภายหลังจากเปิด ใช้ยาครั้งแรก |
|---|---|---|---|---|
| Lidocaine HCl | Docaine [®] 1% inj. Locana [®] 2% inj. | T ≤ 25°C | T ≤ 30°C (หากบริเวณจัดเก็บยา อุณหภูมิเกิน 30°C ต้องเก็บยาไว้ในตู้เย็น) | 30 วัน |
| Lidocaine with Adrenaline | Drocanil-A [®] inj. (1% และ 2%) | T ≤ 30°C | ตู้เย็น (2 - 8 °C) | 30 วัน |
| Silversulfadiazine cream | - | T ≤ 25°C | ตู้เย็น (2 - 8 °C) | 6 เดือน |
| 0.9% Sodium Chloride for Irrigate | | อุณหภูมิห้อง | อุณหภูมิห้อง | 24 ชั่วโมง |
| 70% Alcohchol | | อุณหภูมิห้อง | อุณหภูมิห้อง | 6 เดือน |
| Alcohol Handrub | | อุณหภูมิห้อง | อุณหภูมิห้อง | 6 เดือน |
| 10% Povidone Iodine | | อุณหภูมิห้อง | อุณหภูมิห้อง | 6 เดือน |