บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุล คนไข

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

บัตรเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

ชื่อ-นามสกุล คนไข

.....

ชื่อยาที่เฝ้าระวัง

วันที่เริ่มใช้ยา .....

เครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา

โรงพยาบาลโนนไทย

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้

อาการที่บ่งบอกว่าท่าน “อาจแพ้ยา”

มีไข้สูง ปวดเมื่อย เจ็บคอ คล้ายอาการไข้หวัด

(ที่ไม่ใช่อาการที่มีอยู่เดิม) ร่วมกับ

- มีผื่น ตุ่มพอง หรือจุดแดงบริเวณผิวหนัง
- มีตุ่มน้ำหรือแผลในปาก/หู/จมูก/ก้น/อวัยวะเพศ
- เจ็บตา หนังตาบวม แดง เยื่อบุตาอักเสบ

โดยอาการแพ้ยามักพบหลังจากใช้ยาประมาณ 1-2 สัปดาห์

หากสงสัยว่าแพ้ยา สามารถสอบถามเภสัชกรได้ที่ 044–381032 ต่อ 601-603

หรือมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาล พร้อมทั้งแสดงบัตรนี้